

## O que fazer no final do seu tratamento?

Quando terminar o seu tratamento, provavelmente, você continuará com seu cateter por mais algum tempo. Portanto, é importante retornar ao ambulatório de quimioterapia do HCPA para cuidados de manutenção do cateter a cada dois meses (heparinização). A heparinização é a utilização de heparina diluída no cateter para evitar obstrução e garantir que o cateter fique em perfeitas condições para uso.

A retirada do cateter será realizada somente pelo médico.

**Esclareça todas suas dúvidas com a equipe assistencial, que está lhe atendendo.**


**Participe:** Não fique com dúvidas! É seu direito ter todas as informações! É nosso dever esclarecê-lo!

*Cuide bem do seu portocath.*



Rua Ramiro Barcelos, 2350  
Largo Eduardo Z. Faraco  
Porto Alegre/RS 90035-903  
Fone 51 3359 8000

[www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)



Educação em Saúde  
VOL. 114  
PUBLICAÇÃO AUTORIZADA

# Cuidados com o Cateter Portocath

Orientações para pacientes e familiares

HOSPITAL DE CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



## O que é o portocath?

O portocath é um tipo de cateter colocado cirurgicamente pelo médico. Ele é fixado no peito, abaixo da pele próximo à clavícula. Você receberá orientação da equipe quanto à colocação.

## Por que você precisa dele?

Ele serve para administrar medicamentos especiais para o seu tratamento, receber sangue e coletar exames. O cateter auxilia no seu tratamento, sendo os cuidados com seu uso fundamentais, para não haver complicações, como infecção.

## Como fazer o cuidado do seu cateter em casa?


- Se for para casa com o cateter com agulha, **não a retire, não a empurre**. O portocath deve ser manuseado apenas por um médico ou um enfermeiro.
- Sempre proteja o curativo: **não o molhe**, proteja-o da água, forrando-o com um plástico.
- Se o curativo estiver sujo ou molhado, avise o enfermeiro responsável.

- Se a cobertura ou curativo estiver descolando, reforce as bordas com fita adesiva e, avise, assim que possível, o enfermeiro.



Fonte: Acervo da Comissão de Cateteres (COMCAT)

- Caso seu cateter esteja **sem agulha: não há necessidade de curativo**.



## Quais os sinais de alerta e o que fazer?

Observe se a pele no local apresenta inchaço, dor, vermelhidão e/ou pus, caso haja, comunique ao enfermeiro ou ao médico.

### Rede de comunicação

**1) Adulto:** compareça ou ligue para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - Ambulatório de Quimioterapia - no telefone (51) 3359.8551, das 8h às 23h, de segunda-feira a sexta-feira, para orientações.

**2) Pediatria:** (51) 3359.8521, das 8h às 18h - Unidade de Oncologia Pediátrica 3º Leste ou Ambulatório de Quimioterapia - no telefone (51) 3359.8551, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.